nemapom – Contro le larve svernanti della Carpocapsa

nemapom contiene 500 milioni nematodi della specie *Steinernema feltiae* per la lotta contro le larve svernanti della carpocapsa (*Cydia pomonella*) e della synanthedon (*Synanthenon myopaeformis*).

Quando si applica

Trattamento dopo la raccolta, se il tempo é adatto:
Piú importante é la umidita durante é dopo il trattamento. Idealmente viene applicata sui tronci bagnati quindi in giornate piovose oppure nelle ore serali o in giornate nuvolose con previsioni di pioggia. In caso di assenza di pioggia é obbligatorio eseguire un trattamento con solo acqua prima e qualche ora dopo l'applicazione di Nemapom. É importante garantire condizioni di umiditá elevata per un periodo di almeno 3 ore dall´ intervento. Le temperature medie giornali devono essere non inferiore a 8°C é non superiore a 30°C. I nematodi supportono temperature meno di 8°C, anche gelo per qualche ora.



Come si applica

Si applica 750 milioni di nematodi con un minimo di 1000 l d'acqua per ettaro é metro altezza del tronco. **Per facilitare la penetrazione dell'acqua é consentito usare un bagnante (Silwet, Breakthru, o Trifolio S) nella concentrazione consentito !** É obbligatorio di eliminare i filtri nella spruzzatrice e usare ugelli con le aperture di almeno 0.5 mm (per esempio 120-06 o 120-08). Una pressione superiore di 10 bar puo dannegiare i nematodi. Utillizare acqua a meno di 30°C, mantenere in agitazione la sospensione e utilizzarla entro 5 ore dalla preparazione.

Alberi piccoli: Si tratta soltanto il tronco fino a un metro di altezza. Chiudere i ugelli superiori della spruzzatrice. Il fitofago bersaglio preferisce nascondersi nel punto di innestamento, quindi sicurare il trattamento dalla base del tronco.
Alberi grandi: Trattare il tronco e i rami pricipali, almeno fino ad una altezza di 1.5 m usando almeno 1500 l /acqua con 1.5 miliardi di nematodi.

Preparazione della spruzzatrice

- Pulire bene, sopratutto se é stato usato prima per l'applicazione di insetticidi
- Togliere tutti i filtri
- Riempire con acqua a ¾ dal volume
- Aggiunge i nematodi
- Mantenre la sospension in agitazione
- Aggiunge il bagnante ed il resto d'acqua

Deposito del prodotto

Se possibilie, utillizzare **nemapom** appena ricevuta. Non esporre a temperature meno di 0°C é piú di 30°C. A temperature da 2-12°C **nemapom** puó essere mantenuto per 6 settimane.

Effetto

Il trattemento autunnale con **nemapom** riduce il numero delle larve svernanti della carpocapsa é quindi il inoculo del fitofago nella prima vera. La maggior parte delle larve moie nei primi 24 ore dopo il trattamento.

e-nema® Klausdorfer Str. 28-36, D-24223 Schwentinental , T +49 4307 -82950 , info@e-nema, www.e-nema.de