

nemastar® - Lutte contre la Courtilière est la Noctuelle

nemastar® contient des nématodes de l'espèce *Steinernema carpocapsae* pour la lutte contre la **courtilière** (*Gryllotalpa gryllotalpa*), la **Noctuelle des moissons** (*Agrotis segetum*) et la **Noctuelle epsilon** dans les jardins et gazons.


Période d'application:

Les sols à traiter doivent être humides pour faciliter l'absorption de la pulvérisation.

L'application doit s'effectuer par ciel couvert ou de préférence le matin ou le soir!

Courtilière : De mars à août quand les températures du sol dépassent 12°C.

Noctuelle : De juin à août quand les premières larves sont découvertes.



Dosage

0,5 millions de nématodes par m². Répandre **nemastar®** avec beaucoup d'eau (0.5-1 litre par m²).

nemastar® peut être stocké dans un réfrigérateur à une température de 4 à 12° C jusqu'à la date d'échéance portée sur l'emballage (période limitée).

Conditionnement	Surface à traiter
50 millions nématodes	100 m ²
500 millions nématodes	1000 m ²

Pour d'autres surfaces veuillez ajuster le dosage. Un dosage plus concentré que celui recommandé est sans effets négatifs.


Application

Pour de meilleurs résultats appliquer **nemastar®** le plus tôt possible dès réception. Ne pas exposer **nemastar®** au soleil. **nemastar®** peut être stocké dans un réfrigérateur à température entre 4-12° C jusqu'à la date d'échéance sur l'emballage.

Arrosoir: Diluer le contenu du sachet dans 10 litres d'eau (seau), puis rajouter la quantité d'eau souhaitée. Un arrosoir (10 litres) suffit pour le traitement de 25 m².

Pulvérisateur: Nettoyer bien les équipements et enlever tous les filtres afin d'éviter les bouchages. Utiliser des buses d'un diamètre d'au moins 0.5 mm, ou mieux d'1mm. La pression ne devra pas dépasser les 5 bars.

Le mélange doit se poursuivre pendant la pulvérisation, pour éviter le dépôt de nématodes dans le fond!



Après la pulvérisation arroser la zone traitée afin de laver les nématodes adhérant aux plantes dans la terre !

Efficacité

Courtilière: **nemastar®** est très efficace contre les adultes mais pas contre les jeunes larves. Nous recommandons de renouveler l'application l'année suivante.

Noctuelle : **nemastar®** est très efficace contre la Noctuelle epsilon et la noctuelle des moissons. Les premiers larves meurent environ 4 jours après l'application.

Contre-indications

La matière active et la formulation de **nemastar®** sont absolument sans danger pour les cultures, les insectes utiles, l'environnement et les êtres humains. Il n'existe aucune restriction pour l'application de **nemastar®**.

e-nema®

Gesellschaft für Biotechnologie und biologischen Pflanzenschutz mbH

Klausdorfer Str. 28-36

T +49 (0)4307-82950

info@e-nema.de

D-24223 Schwentinental

F +49 (0)4307-829514

www.e-nema.de

