

Lagerung

nema-care® im Kühlschrank bei 4-8°C aufbewahren. Die Nematoden sind mindestens bis zum aufgedruckten Datum wirksam. Je eher sie ausgebracht werden, desto besser.

Ausbringungsbedingungen

Der Boden bzw. das Substrat muss feucht sein und zwei Wochen lang feucht gehalten werden. Nicht bei direkter Sonne ausbringen.

Die Nematoden am besten abends, bei bedecktem Himmel oder im Regen ausbringen. Die Bodentemperatur muss für einige Stunden am Tag mindestens 12°C betragen.



Schädling	Anwendungszeit
Kleine Kohlflye	April - Juli
Lauchmotte	Juni - September
Möhrenfliege	Mai - September
Zwiebelfliege	Mai - August
Erdfloh	April - August
Erdräupen	April - September
Spargelhähnchen	Juni - September
Bohnenfliege	Mai - Juli

Ausbringung

Die Ausbringung erfolgt mit der Gießkanne oder dem Nema-Sprayer.


Nematodenpulver wie angegeben anmischen und sofort ausbringen. Die angemischte Nematodenlösung alle 15 Minuten aufrühren.

Packungsgröße	reicht für	anmischen in	Nema-Sprayer
10 Millionen	20 m ²	2 l Wasser	400 ml Wasser

Um einen hohen Wirkungsgrad zu erzielen, beide Packungen im Abstand von 14 Tagen ausbringen.

Beutelinhalt laut Tabelle in 2 Liter Wasser auflösen, dabei gut umrühren.

1 Liter Nematodenlösung in eine Gießkanne mit 9 Liter Wasser geben.



Den Inhalt der Gießkanne auf 10 m² Boden gießen.

Den Vorgang wiederholen, bis die gesamte Nematodenlösung aufgebraucht ist.

Videos:

Nematoden richtig anwenden:



Nema-Sprayer – Nematoden dosiert ausbringen:

