



































Nematoden gegen Rasenschädlinge

	Larve	Schadbild	Bestimmung	Nützlinge	Bekämpfungszeit
Gartenlaubkäfer     	<p>12 Monate</p>	<p>Larve < 20 mm, Engeringe unter Rasennarbe, Analspalt ähnelt grinsendem Mund</p>	<p>Sechs Wochen nach Käferflug</p> <p>Zur unterstützenden Behandlung! Lockstoff-Fallen im Mai aufstellen</p>	<p>J F M A M J J A S O N D</p>	
Junikäfer     	<p>24 Monate</p>	<p>Larve > 20 mm, Analspalt hat Form eines »Ypsilon«, »Mercedesstern«</p>	<p>Wirkt nur gegen 1. Larvenstadium</p>	<p>J F M A M J J A S O N D</p>	
Maulwurfgrille    	<p>Adulte verursachen den Schaden</p>	<p>zerwühlte Saatbeete, angefressene Wurzeln und Knollen vor allem bei Gemüse, Kartoffeln und Rasen</p>	<p>weiße, ameisenähnliche Larven; bekämpft werden aber die adulten Tiere</p>	<p>Behandlung im folgenden Jahr wiederholen</p>	<p>J F M A M J J A S O N D</p>
Purzelkäfer    	<p>24 Monate</p>	<p>Larve < 20 mm, „Pelz“ auf dem Rücken</p>		<p>J F M A M J J A S O N D</p>	
Haarmücke    	<p>12 Monate</p>	<p>vergilbte Befallsnester im Rasen mit bis zu 300 Larven im März/April</p>	<p>Larve < 15 mm, beinlos, wurmartig, graubraun</p>	<p>J F M A M J J A S O N D</p>	
Dungskäfer    	<p>12 Monate</p>	<p>Schäden an Rasen schon im zeitigen Frühjahr, da während des ganzen Winters aktiv</p>	<p>Larve < 15 mm, unspezifischer Analspalt</p>	<p>J F M A M J J A S O N D</p>	
Erdräupen    	<p>6 Monate</p>	<p>grau-grünlich gefärbt, 3-5 cm lang, glatte Haut ohne Haare, 3 Beinpaare</p>		<p>J F M A M J J A S O N D</p>	
Wiesenschnake    	<p>12 Monate</p>	<p>nesterweise Kahlstellen im Rasen, im März/April Schäden durch pickende Vögel</p>	<p>graue, beinlose, tönchenförmige Larve, zusammengezogen 1 cm, gestreckt bis 4 cm; Teufelsfratze am Anus</p>	<p>J F M A M J J A S O N D</p>	