

# nemastar®

## Bekämpfung von Palmrüssler und Palmenmotte (*Paysandisia archon*)

### Lagerung

nemastar® im Kühlschrank bei 4-8°C aufbewahren. Die Nematoden sind mindestens bis zum aufgedruckten Datum wirksam. Je eher sie ausgebracht werden, desto besser.

### Ausbringungszeiten:


Kurativ (Palme bereits befallen:) alle 4 Wochen

Präventiv: alle 6 Wochen

Temperaturen bei der Anwendung zwischen 14° und 30°C.

Im Juli und August wegen zu hoher Temperaturen pausieren.

Nicht bei direkter Sonne ausbringen.



### Ausbringung

Wenn möglich abends behandeln, wenn die Temperaturen niedriger sind.

Von oben auf die Ansätze der Palmwedel und den obersten Meter des Stammes sprühen. Die Palme dabei sehr gründlich benetzen, d.h. sprühen, bis das Wasser abtropft.

Packungsgröße	Ausbringen mit	Ausreichend für
25 Millionen	25 Liter Wasser	1-2 Palmen
50 Millionen	50 Liter Wasser	2-5 Palmen
250 Millionen	250 Liter Wasser	10-25 Palmen
500 Millionen	500 Liter Wasser	20-50 Palmen

10-25 Millionen Nematoden pro Palme (10 Millionen bei kleinen Palmen)  
in 5 - 20 Liter Wasser bzw. 1 Million Nematoden pro Liter Spritzbrühe.

Wenn Chitosan erhältlich ist: 10 ml pro Palme oder pro 5 Liter Wasser  
(=0,2%ig).

Video:

**Haben Sie Fragen?**

[beratung@e-nema.de](mailto:beratung@e-nema.de)

Wir helfen Ihnen weiter!

04307/8295-295

