



Gebrauchsanleitung Nematoden




Möglichst bald nach Erhalt ausbringen.
Niemals einfrieren, bei 4°- 8 °C lagern.
Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen.




Nur anwenden bei Bodentemperaturen von:
 8°- 28 °C für *Steinernema feltiae*
 12°-30 °C für *Heterorhabditis bacteriophora*
 + *Steinernema carpocapsae*




Auf feuchtes Blatt oder Boden ausbringen.
 Falls notwendig vorwässern.
 Idealerweise bei bedecktem Himmel oder abends ausbringen.
Sofort nach Ausbringung einwässern.




1-5 Beutel in 10 Liter Wasser auflösen.
 Immer gesamten Beutel auflösen.
 1-2 Minuten rühren und dann in Spritz- oder Ansaugbehälter gießen.



Alle Filter und Siebe aus dem Spritzgerät entfernen.
Spritzbrühe ständig in Bewegung halten.



Nicht uneingeschränkt mit chemischen Mitteln mischbar. Verträglichkeitsliste unter [www.e-nema.de /service](http://www.e-nema.de/service)
 Im Zweifelsfall eine Woche vor oder nach Anwendung von Insektiziden ausbringen.
Keine Tankmischung mit Düngemitteln
 Düngung vor oder nach Ausbringung möglich.



Düsen mit mindestens 0,8 mm Durchmesser verwenden.
Druck nicht über 20 bar